


**Ефект на Розвера 15 мг и 30 мг върху липидния
профил при пациенти с дислипидемия
„BULGARIAN ROSE - BULGARIAN ROSwera
Evaluation Study”**

**проф. Димитър Раев д.м.н.
УМБАЛ “Св. Анна” София**


ARTIST: у нас се използват ниски инициални дози статини

Средни дози статини



ARTIST: Основна причина за неповишаване на дозата е опасението от поява на стр. ефекти

Честота на опасения от стр. ефекти според специалността



Доц. Д-р Пламен Петровски



Военномедицинска академия гр.София

**Началник Клиника по функционална диагностика на сърдечно-
съдовата система**



Roswera[®]

rosuvastatin



30 таблетки 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 30mg, 40mg

**Резултати от собствено
проучване с хибридни
дозы розувастатин
(15mg, 30mg)**




*Our innovation and knowledge
for effective and safe
products of the highest quality.*

Ретроспективен анализ на пациенти лекувани с хибридна форма на Roswera[®] – 15mg и 30mg


- Включени 50 пациента, отпаднали 4 поради непридържане към терапията, за 6 месеца лечение с Roswera[®] (15/30mg)
- Всички включени пациенти са с **ВИСОК И МНОГО ВИСОК сърдечно-съдов риск** – 100%
- **М/Ж – 48% / 52%**
- **Ср. възраст – 62,5г.**
- Група А: Статин наивни – 68 %
- Група В: Предшестваща липидопонижаваща терапия – 32 %

Ретроспективен анализ на пациенти лекувани с хибридна форма на Roswera[®] – 15mg и 30mg


- 42- лекувани с 15 мг, 4 - с 30мг Roswera[®] / дневно
- Наблюдавани за нежелани лекарствени реакции- преходна миалгия- 3 пациенти (6.5%)
- Незначително повишение на СРК (1.2%) при пациентите с миалгия
- Незначително повишение (а в някои случаи понижение) на аминотрансферазите
- Лекувани 2 случая на нефрозен синдром (30мг) с отличен ефект без усложнения



Група А – Изменение в липидния профил




Група А – Процентно изменение на липидния профил



	TC	TG	HDL	LDL
5 mg	-29%	-15%	6,9%	-41%
10 mg	-33%	-20%	7,7%	-46%
20 mg	-38%	-24%	9,5%	-52%
40 mg	-40%	-26%	9,6%	-55%


* Процентното изменение е за средна стойност на липидите

Група В – Изменение в липидния профил




*Изходните стойности са усреднени

Група В – Процентно изменение на липидния профил*



* Процентното изменение е за средни стойности на липидите

Група В – Процентно изменение на липидния профил



*Изходните стойности са усреднени

- IVUS проучване* от 2006г. върху 500 пациента, доказва че:
 - 40мг Розувастатин за 2 години
 - Намаление на LDL –холестерола средно от 3.37 на < 1.80 mmol/l
 - Total atheroma reduction- 6.1mm³

- IVUS проучване* от 2014г. върху 103 пациента, доказва че:
 - 40мг Розувастатин за 13 месеца
 - Редуцира LDL- холестерола от 3.29 на 1.89 mmol/l
 - Total atheroma reduction- 13.7mm³

- Хибридните таблетни форми на Roswera® (15mg, 30 mg) са подходящи както за първична, така и за вторична профилактика на сърдечно - съдови инциденти
- Те са удобни с оглед по-доброто придържане на пациентите към предписаната терапия и за по-лесно достигане на таргетните стойности
- По- високите от обичайните дози не водят до увеличаване броя и тежестта на нежелани лекарствени реакции

- В случаите с намаляване на аминотрансферазите вероятно се касае за fatty liver (мастна дегенерация на хепатоцитите)
- Добавянето на хибридни дози Roswera към терапията на нефрозен синдром има добър клиничен и лабораторен ефект
- Нашите данни съвпадат с литературните данни за липса на рабдомиолиза дори при дълговременно лечение с розувастатин
- При този тип проучване не съществува сигурност в комплайънса на пациентите



“Моите сътрудници откриха в последните години изолирани племена в Африка и около Амазонка, които не страдат от коронарна болест и имат LDL-холестерол под 1 mmol/l. Статините са широко недоизползувани в световен мащаб”

**Ю. Браунвалд ,
31 август 2014г. Барселона**

**Благодаря за
вниманието !**